

ANNEXE N°5

Liste des espèces recommandées pour les bandes enherbées le long des cours d'eau

Luzerne (L)
Dactyle (G)
Fétuque des prés (G)
Fétuque élevée (G)
Fétuque rouge (G)
Fléole des prés (G)
Ray-grass anglais (G)
Ray-grass hybride (G)
Brome cathartique (G)
Brome sitchensis (G)

Couverts autorisés à titre exceptionnel:

Fétuque ovine (G) (A)
Paturin (G)

ANNEXE N°6

LISTE INDICATIVE D'ESPECES POUVANT ETRE UTILISEES COMME CULTURE INTERMEDIAIRE PIEGE A NITRATES (CIPAN) DANS LE CADRE DE LA MESURE 4-8 : COUVERTURE DES SOLS EN PERIODE A RISQUE DE LESSIVAGE

Espèce	Famille	Densité de semis (kg/ha) (*)
Avoine	<i>Graminées</i>	60 à 80
Colza	<i>Crucifères</i>	5 à 8
Moutarde blanche	<i>Crucifères</i>	15
Moutarde brune	<i>Crucifères</i>	15
Navette fourragère	<i>Graminées</i>	15
Phacélie	<i>Hydrophyllacées</i>	15
Radis fourrager	<i>Crucifères</i>	15
Ray Grass (RGI)	<i>Graminées</i>	15 à 30
Sarrasin	<i>Polygonacées</i>	30 à 40
Seigle	<i>Graminées</i>	40 à 80
Sorgho fourrager	<i>Graminées</i>	30

(*) : ces chiffres sont données à titre indicatif

Cette liste n'est pas exhaustive, certains mélanges pouvant également présenter d'autres intérêts.